

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ヘリンNa0.9%用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘリン0.9%） ワンショット：1日1回	1筒 1筒	●	●	●	●
注射	2	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL ボラミン注 5mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6A 1A 100mL	●	●	●	●
注射	3	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分以上かけて	1瓶	●	●	●	●
注射	4	点滴注射 ダラザレックス注（16mg/kg） 生理食塩液注 1L 点滴注射：1日1回 初回1時間は50mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ上げ、200mL/hまで。 インラインフィルターを使用。	16mg/kg 1000mL	●			
注射	5	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回	1瓶	●			
注射	6	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●			
注射	7	点滴注射 ダラザレックス注（16mg/kg） 生理食塩液注【生食】 500mL 点滴注射：1日1回 最初1時間は50mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ上げ、200mL/hまで。 インラインフィルターを使用。	16mg/kg 500mL		●		
注射	8	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回	1瓶		●		
注射	9	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒		●		
注射	10	点滴注射 ダラザレックス注（16mg/kg） 生理食塩液注【生食】 500mL 点滴注射：1日1回 最初1時間は100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ上げ、200mL/hまで。 インラインフィルターを使用。	16mg/kg 500mL			●	●
注射	11	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回	1瓶			●	●
注射	12	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒			●	●
内服							
		レナリドミド	25mg/日 分1 食後		day(1)～(21)服用		
内服							
		レナデックス	20mg/日 分1 食後		day(2)(9)(16)(23)服用		