

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射 2	点滴注射		●	
	デキサート注 3.3mg / 1ml (10A/body)	10A		
	生食注 (生理食塩液) 100ml (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 3	点滴注射		●	
	ジェムザール注 (1000mg/m <sup>2</sup> )	1000mg / m <sup>2</sup>		
	5%ブドウ糖注 100ml	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 4	点滴注射		●	
	生理食塩液 PL 50ml	50mL		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射 5	静脈内注射		●	
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用			
注射 6	点滴注射			●
	デキサート注 3.3mg / 1ml	6.6mg		
	生食注 (生理食塩液) 100ml (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 7	点滴注射			●
	ジェムザール注 (1000mg/m <sup>2</sup> )	1000mg / m <sup>2</sup>		
	5%ブドウ糖注 100ml	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 8	点滴注射			●
	生理食塩液 PL 50ml	50mL		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射 9	静脈内注射			●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用			
内服 内服				
	デキサメタゾン	40mg/日 分1食後		day(2)~(4)服用