

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより) 生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●
注射 2	点滴注射 デキサート注 3.3 mg / 1 mL アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL 点滴注射：1日1回 30分で	6.6 mg 1袋	●
注射 3	点滴注射 パージェタ注 (420mg/Body) 生理食塩液注 250 mL (ソフトバッグ) 2回目以降30分可 点滴注射：1日1回	420 mg 250 mL	●
注射 4	点滴注射 トラストズマブBS注 (6mg/kg) 生理食塩液注 250 mL (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 2回目以降30分可。	6 mg/kg 250 mL	●
注射 5	点滴注射 ドセタキセル注 (75mg/m ²) 生理食塩液注 250 mL (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 1時間で	75 mg/m ² 250 mL	●
注射 6	点滴注射 カルボプラチン (AUC=6) 5%ブドウ糖注 250 mL 点滴注射：1日1回 60分で	0 mg/A 250 mL	●
注射 7	点滴注射 生理食塩液 PL 50 mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で	1瓶	●
注射 8	静脈内注射 生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)	1筒	●