

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)
注射	1	静脈内注射		●		●		●	
		生食注シリンジ 20m l【要時】ロック付	1筒						
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンロック)	1筒						
		ワンショット：1日1回							
		(不要の場合は削除)							
注射	2	点滴注射		●		●		●	
		ボラミン注 5mg / 1m l	1A						
		ハイドロコートン注 100mg / 2m l	100mg						
		生食注（生理食塩液） 100m l（PG）	100mL						
		点滴注射：1日1回							
		30分で							
注射	3	点滴注射		●		●		●	
		ベスポンサ注 1mg	0.5mg / m ²						
		(0.5mg/m ²)							
		注射用水 20mL	1A						
		(ベスポンサ溶解用)							
		生理食塩液PL 50m l	50mL						
		点滴注射：1日1回							
		★遮光袋に入れて払い出し★							
		60分で							
注射	4	点滴注射		●		●		●	
		生理食塩液PL 50m l	1瓶						
		点滴注射：1日1回							
		フラッシュ用							
注射	5	持続点滴		●		●		●	
		ソルデム3A注 500m l	500mL						
		★ 20m l メイロン84注	1A						
		持続点滴：1日1回							
		8時間で							
注射	6	持続点滴		●		●		●	
		ソルデム3A注 500m l	500mL						
		★ 20m l メイロン84注	1A						
		持続点滴：1日1回							
		8時間で							
注射	7	持続点滴			●		●		●
		ソルデム3A注 500m l	500mL						
		★ 20m l メイロン84注	1A						
		持続点滴：1日1回							
		8時間で							
注射	8	静脈内注射			●		●		●
		生食注シリンジ 20m l ロック付	1筒						
		ワンショット：1日1回							
		(不要の場合は削除)							
		フラッシュ用							