

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1 静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
	ペリナドック用100単位/mLシリンジ 10mL(ペリドック)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2 点滴注射		●	
	ソルデム3A注 500mL	500mL		
	点滴注射：1日1回 メイン 3時間で			
注射	3 点滴注射		●	
	ボララミン注 5mg/1mL	1A		
	ハイドロコトシ注 100mg/2mL	100mg		
	生食注(生理食塩液) 100mL(PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	4 点滴注射		●	
	リツキシマブBS注 (375mg/m ²)	375mg/m ²		
	生理食塩液注【生食】 500mL (1mg/mLになるように調製)	500mL		
	生理食塩液注 250mL(ソフトバッグ) (リツキシマブの希釈に使用)	1袋		
	点滴注射：1日1回 初回50mL/hで開始。30分毎に50mL/hずつ上げ 400mL/hまで。2回目以降100mL/hで開始。30 分毎に100mL/hずつ上げ400mL/hまで。 3-4h。2回目以降2-3h。			
注射	5 点滴注射		●	
	水溶性ブレドニオン注 (60mg/m ² ・Max100mg/B)	60mg/m ²		
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	6 点滴注射		●	
	ジェムザール注 (1000mg/m ²)	1000mg/m ²		
	5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	7 点滴注射		●	
	オンコピン注 (1.4mg/m ² 、最大2mg/B)	1.4mg/m ²		
	生理食塩液PL 50mL	50mL		
	点滴注射：1日1回 全開。			
注射	8 点滴注射		●	
	エンドキサン注 (750mg/m ²)	750mg/m ²		
	生理食塩液注 250mL(ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 90分で			
注射	9 点滴注射		●	
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	10 静脈内注射		●	
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用			
注射	11 点滴注射			●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
	生食注(生理食塩液) 100mL(PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	12 点滴注射			●
	ジェムザール注 (1000mg/m ²)	1000mg/m ²		
	5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	13 点滴注射			●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	14 静脈内注射			●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用			
内服				
	ブレドニゾン	60mg/m ² 分1食後	day(2)~(5)服用	