

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用		
注射 3	点滴注射		●
	テセントリク注	1200mg	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L	
	(1200mg/body) 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 初回60分、忍容性良ければ2回目以降30分に短縮可。		
注射 4	点滴注射		●
	デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6mg	
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L	
	点滴注射：1日1回 15分で		
注射 5	点滴注射		●
	アリムタ注射用	500mg / m ²	
	(500mg / m ²) 生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L	
	点滴注射：1日1回 10分で		
注射 6	点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 7	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		