

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	デキサート注 3.3 mg / 1 mL	6.6 mg	
	アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 3	点滴注射		●
	トラスツズマブBS注 (6mg/kg)	6 mg / kg	
	生理食塩液注 250 mL (ソフトバッグ)	250 mL	
	点滴注射：1日1回 2回目以降30分可。		
注射 4	点滴注射		●
	ドセタキセル注 (75mg/m ²)	75 mg / m ²	
	生理食塩液注 250 mL (ソフトバッグ)	250袋	
	点滴注射：1日1回 1時間で		
注射 5	点滴注射		●
	カルボプラチン (AUC=6)	0 mg / A	
	5%ブドウ糖注 250 mL	250 mL	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 6	点滴注射		●
	生理食塩液PL 50 mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で		
注射 7	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)		