

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射 (リザーバーより)		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
	パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(パリンロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	5A	
	パラミン注 5mg/1mL	1A	
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	3 点滴注射		●
	リツキシマブBS注	375mg/m ²	
	生理食塩液注 【生食】 500mL (1mg/mLになるように調製)	500mL	
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) (リツキシマブの希釈に使用)	1袋	
	点滴注射：1日1回 初回50mL/hで開始。30分毎に50mL/hずつ上げ 400mL/hまで。2回目以降100mL/hで開始。30 分毎に100mL/hずつ上げ400mL/hまで。 3-4h。2回目以降2-3h。		
注射	4 点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	5 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)		
内服			
	シクロホスファミド	200mg/m ² 分1 食後	day(1)~(5)服用