

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘミロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2	点滴注射		●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg	
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回 30分で		
注射	3	点滴側管注		●
		アクプラ注 (90mg/m ²)	90mg/m ²	
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回 2時間で		
注射	4	点滴注射		●
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回 アクプラ終了後①。 60分で		
注射	5	点滴注射		●
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回 アクプラ終了後②。 60分で		
注射	6	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	7	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）		
注射	8	持続点滴		●
		5-FU注 (4000mg/m ² /96時間)	4000mg/m ²	
		生食注（生理食塩液）100mL（PG） (全量185mLに調製)	1瓶	
		持続点滴：1日1回 インフューザ-LV2(黄色)使用 96時間で		