

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ヘパリンNa用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパロック)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射 2	点滴注射		●	
	デキサート注 3.3mg / 1ml	6.6mg		
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 3	点滴注射		●	
	アバスチン注 (15mg/kg)	15mg/kg		
	生食注(生理食塩液) 100m l (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 4	点滴注射		●	
	ジェムザール注 (1000mg/m ²)	1000mg/m ²		
	5%ブドウ糖注 100m l	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 5	点滴注射		●	
	カルボプラチン (AUC=4)	0mg/A		
	5%ブドウ糖注 250m l	250mL		
	点滴注射：1日1回 60分で			
注射 6	点滴注射		●	
	生理食塩液 PL 50m l	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射 7	静脈内注射		●	
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用			
注射 8	点滴注射			●
	デキサート注 3.3mg / 1ml	6.6mg		
	生食注(生理食塩液) 100m l (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 9	点滴注射			●
	ジェムザール注 (1000mg/m ²)	1000mg/m ²		
	5%ブドウ糖注 100m l	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 10	点滴注射			●
	生理食塩液 PL 50m l	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射 11	静脈内注射			●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用			