

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒	
	ﾊﾟｰﾘﾝNaﾈｯｸ用100単位/mLシリンジ 10mL(ﾊﾟｰﾐｯｸ)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保及びフラッシュ用(キトルダ)		
注射 3	点滴注射		●
	キトルダ注 (200mg/body)	200mg	
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分で		
注射 4	点滴側管注		●
	プロイメンド注 150mg	150mg	
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L	
	点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30分で		
注射 5	点滴側管注		●
	デキサート注 3.3mg/1ml	9.9mg	
	アロキ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 15分で		
注射 6	点滴側管注		●
	マンニトールS注 300mL/袋	300m L	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 7	点滴側管注		●
	シスプラチン注 (100mg/ml)	100mg/ml	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で		
注射 8	点滴側管注		●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 (フラッシュ用)		
注射 9	点滴注射		●
	ソルデム3A注 500m l	500m L	
	点滴注射：1日1回 キトルダ終了後に開始 90分で		
注射 10	点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500m L	500m L	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 11	点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500m L	500m L	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 12	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)		
注射 13	点滴注射(リザーバーより)		●
	5-FU注 (4000mg/ml)	4000mg/ml	
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 LV2で全量185mLに調製。 96時間で		