

| 分類 No. | 薬剤/手技 | 投与量 | day(1) | day(8) | day(15) |
|--------|-------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------|
| 注射 1 | 静脈内注射 | | ● | ● | ● |
| | 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 | 1筒 | | | |
| | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック) | 1筒 | | | |
| | ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) | | | | |
| 注射 2 | 点滴注射 | | ● | ● | ● |
| | デキサート注 3.3mg / 1ml | 6.6mg | | | |
| | ガスター注 20mg | 1A | | | |
| | ポララミン注 5mg / 1ml | 1A | | | |
| | 生食注(生理食塩液) 100ml (PG) | 100mL | | | |
| | 点滴注射：1日1回 30分で | | | | |
| 注射 3 | 点滴注射 | | ● | ● | ● |
| | パクリタキセル注 (70mg/m ²) | 70mg/m ² | | | |
| | 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) | 250mL | | | |
| | 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で | | | | |
| 注射 4 | 点滴注射 | | ● | ● | ● |
| | 生理食塩液PL 50ml | 1瓶 | | | |
| | 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で | | | | |
| 注射 5 | 静脈内注射 | | ● | ● | ● |
| | 生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付 | 1筒 | | | |
| | ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除) | | | | |