

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●	
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
	ペリナナック用100単位/mLシリンジ 10mL(ペミナック)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射 2	点滴注射		●	
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 トリアキシン終了後、抜去可			
注射 3	点滴注射		●	
	ハイドロコト注 100mg/2mL	100mg		
	ボラミン注 5mg/1mL	1A		
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用 30分で			
注射 4	点滴注射		●	
	リツキシマブBS注 (375mg/m <sup>2</sup> )	375mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液注 【生食】 500mL (1mg/mLになるように調製)	500mL		
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) (リツキシマブの希釈に使用)	1袋		
	点滴注射：1日1回 初回50ml/hrで開始。30分毎に50ml/hrずつ上げ 400ml/hrまで。2回目以降に100ml/hrで開始。 30分毎に100ml/hrずつ上げ400ml/hrまで			
注射 5	点滴注射		●	
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
	点滴注射：1日1回 30分かけて			
注射 6	点滴注射		●	
	ポライビー注 (1.8mg/kg)	1.8mg/kg		
	注射用水 20mL (ポライビー溶解用)	1A		
	5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
	インラインフィルター使用 初回投与時忍容性良ければ、2回目以降30分可 点滴注射：1日1回			
注射 7	点滴注射		●	
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶		
	点滴注射：1日1回 経過観察用 30分かけて			
注射 8	点滴注射		●	
	トリアキシン注 (90mg/m <sup>2</sup> )	90mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液PL 50mL	50mL		
	点滴注射：1日1回 10分			
注射 9	点滴注射		●	
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射 10	静脈内注射		●	
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
	ペリナナック用100単位/mLシリンジ 10mL(ペミナック)	1筒		
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)			
注射 11	点滴注射		●	
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 トリアキシン終了後、抜去可			
注射 12	点滴注射		●	
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 13	点滴注射		●	
	トリアキシン注 (90mg/m <sup>2</sup> )	90mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液PL 50mL	50mL		
	点滴注射：1日1回 10分			
注射 14	点滴注射		●	
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用			