

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ベリナNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ベリナ） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●
注射 2	持続点滴 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 持続点滴：1日1回 トレアキシン終了後、抜去可 メイン	250mL	●	
注射 3	点滴注射 ポララミン注 5mg/1mL ハイドロコトロン注 100mg/2mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	1A 100mg 100mL	●	
注射 4	点滴注射 リツキシマブBS注 （375mg/m <sup>2</sup> ） 生理食塩液注【生食】 500mL （1mg/mLになるように調製） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） （リツキシマブの希釈に使用） 点滴注射：1日1回 初回50mL/hで開始。30分毎に50mL/hずつ上げ 400mL/hまで。2回目以降100mL/hで開始。30 分毎に100mL/hずつ上げ400mL/hまで。 3-4h。2回目以降2-3h。	375mg/m <sup>2</sup> 500mL 1袋	●	
注射 5	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 15分で	6.6mg 1袋	●	
注射 6	点滴注射 トレアキシン注 （90mg/m <sup>2</sup> ） 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 10分で	90mg/m <sup>2</sup> 50mL	●	
注射 7	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●	
注射 8	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●	
注射 9	点滴注射 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 トレアキシン終了後、抜去可 メイン	250mL		●
注射 10	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 100mL		●
注射 11	点滴注射 トレアキシン注 （90mg/m <sup>2</sup> ） 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 10分で	90mg/m <sup>2</sup> 50mL		●
注射 12	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶		●
注射 13	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒		●