

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(15)
注射 1	点滴注射 ボラミン注 5mg/1ml 生理食塩液PL 50ml 点滴注射：1日1回 30分	1A 50mL	●		●	●
注射 2	点滴注射 ガザイバ注 (1000mg/body) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) (全量250mlに調製) インラインフィルター使用 点滴注射：1日1回 初回12.5mL/hで開始。30分毎に12.5mL/hずつ上げ 100mL/hまで。2回目以降30mL/hで開始。30分毎に25mL/hずつ上げ100mL/hまで。 4.5h、2回目以降3.5h。	1000mg 250mL	●			●
注射 3	点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●			
注射 4	持続点滴 ソルデム3A注 500ml ★ 20ml メイロン84注 持続点滴：1日1回 8-12時間	500mL 1A	●			
注射 5	持続点滴 ソルデム3A注 500ml ★ 20ml メイロン84注 持続点滴：1日1回 8-12時間	500mL 1A	●			
注射 6	点滴注射 アロキン注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分	1袋		●		
注射 7	点滴注射 オンコピン注 (1.4g/m ² 、最大2mg/B) 生理食塩液PL 50ml 点滴注射：1日1回 適宜。 全開。	1.4g/m ² 50mL		●		
注射 8	点滴注射 エンドキサン注 (750g/m ²) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 90分	750g/m ² 250mL		●		
注射 9	点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶		●		
注射 10	持続点滴 ソルデム3A注 500ml ★ 20ml メイロン84注 持続点滴：1日1回 8-12時間	500mL 1A		●		
注射 11	持続点滴 ソルデム3A注 500ml ★ 20ml メイロン84注 持続点滴：1日1回 8-12時間	500mL 1A		●		
注射 12	静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒		●		
注射 13	静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付 ベリナ [®] ナ [®] カ用100単位/mLシリンジ 10mL(ベリナ [®]) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒 1筒		●		
注射 14	点滴注射 ガザイバ注 (1000mg/body) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) (全量250mlに調製) 点滴注射：1日1回 初回12.5mL/hで開始。30分毎に12.5mL/hずつ上げ 100mL/hまで。2回目以降30mL/hで開始。30分毎に25mL/hずつ上げ100mL/hまで。 4.5h、2回目以降3.5h。	1000mg 250mL			●	
注射 15	点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶			●	●
注射 16	静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒			●	●
注射 17	静脈内注射 生食注シリンジ 20ml 【要時】ロック付 ベリナ [®] ナ [®] カ用100単位/mLシリンジ 10mL(ベリナ [®]) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒 1筒			●	●
内服	プレニゾン	60mg/m ² 分1食後			day(1)~(5)服用	