

| 分類 No. | 薬剤/手技 | 投与量 | day(1) | day(8) | day(15) |
|--------|--|-------------------|--------|--------|---------|
| 注射 1 | 静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 へりNa ⁺ 用100単位/mLシリンジ 10mL(ベミナック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) | 1筒 1筒 | ● | ● | ● |
| 注射 2 | 点滴注射 生食注（生理食塩液）100m l（PG） 点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用（ネトラク） | 1瓶 | ● | ● | |
| 注射 3 | 点滴注射 【要時】テセントリク注 840m g 生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ） (840mg/body) 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 初回60分、忍容性良ければ2回目以降30分に短縮可。 | 250m L | ● | ● | |
| 注射 4 | 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 (テセントリクと別ルート) 30分 | 6.6g 1袋 | ● | | |
| 注射 5 | 点滴注射 生食注（生理食塩液）100m l（PG） 点滴注射：1日1回 ア ⁺ 注投与前後フラッシュ用 | 1瓶 | ● | | |
| 注射 6 | 点滴注射 アブラキサン注 (100mg/ml) 生理食塩液PL 50m l (1 ⁺ イ ⁺ あたり20mLで溶解) 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分 | 100mg/ml 50m L | ● | | |
| 注射 7 | 静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 | 1筒 | ● | | |
| 注射 8 | 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml 生食注（生理食塩液）100m l（PG） 点滴注射：1日1回 30分 | 6.6g 100m L | | ● | |
| 注射 9 | 点滴注射 生理食塩液PL 50m l 点滴注射：1日1回 ア ⁺ 注投与前後フラッシュ用 | 1瓶 | | ● | |
| 注射 10 | 点滴注射 アブラキサン注 (100mg/ml) 生理食塩液PL 50m l (1 ⁺ イ ⁺ あたり20mLで溶解) 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分 | 100mg/ml 50m L | | ● | |
| 注射 11 | 静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 | 1筒 | | ● | |
| 注射 12 | 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分 | 6.6g 1袋 | | | ● |
| 注射 13 | 点滴注射 生理食塩液PL 50m l 点滴注射：1日1回 ア ⁺ 注投与前後フラッシュ用 | 1瓶 | | | ● |
| 注射 14 | 点滴注射 アブラキサン注 (100mg/ml) 生理食塩液PL 50m l (1 ⁺ イ ⁺ あたり20mLで溶解) 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分 | 100mg/ml 50m L | | | ● |
| 注射 15 | 点滴注射 生理食塩液PL 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分 | 1瓶 | | | ● |
| 注射 16 | 静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 | 1筒 | | | ● |