

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2 点滴注射		●
	デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	6.6 m g	
	生食注（生理食塩液）100 m l （P G）	100m L	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	3 点滴注射		●
	トラスツズマブB S 注	6m g /kg	
	6mg/kg		
	生理食塩液注 250 m l （ソフトバッグ）	250m L	
	点滴注射：1日1回 2回目以降：30分可。		
注射	4 点滴注射		●
	生理食塩液P L 50 m l	50m L	
	点滴注射：1日1回 アブラキサン投与前後フラッシュ用。		
	10 分で		
注射	5 点滴注射		●
	アブラキサン注	260m g /m ²	
	（260mg/m ² ）		
	生食注（生理食塩液）100 m l （P G）	100m L	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可		
	30 分で		
注射	6 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）		