

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘミロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2 点滴注射		●
	デキサート注 3.3 mg / 1 mL	6.6 mg	
	アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	3 点滴注射		●
	トラスツズマブBS注 (2mg/kg)	2 mg / kg	
	生理食塩液注 250 mL（ソフトバッグ）	250 mL	
	点滴注射：1日1回 2回目以降；30分可。		
注射	4 点滴注射		●
	カンプト注 (100mg/m ²)	100 mg / m ²	
	生理食塩液注 250 mL（ソフトバッグ）	250 mL	
	点滴注射：1日1回 90 分で		
注射	5 点滴注射		●
	生理食塩液PL 50 mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10 分で		
注射	6 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）		