

レジメン名称：H18-302 HER/XP（2回目以降） 休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリンロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2	点滴側管注		●
		生理食塩液 PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 （プライミング用）		
注射	3	点滴側管注		●
		プロイメンド注 150mg	150mg	
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
		点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30分で		
注射	4	点滴側管注		●
		アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋	
		デキサート注 3.3mg / 1mL	9.9mg	
		点滴注射：1日1回 15分で		
注射	5	点滴側管注		●
		ハーセプチン注 (6mg/kg)	6mg/kg	
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL	
		点滴注射：1日1回 2回目以降30分可。		
注射	6	点滴側管注		●
		マンニトールS注 300mL / 袋	300mL	
		点滴注射：1日1回 30分で		
注射	7	点滴側管注		●
		シスプラチン注 (80mg/m ²)	80mg/m ²	
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL	
		点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で		
注射	8	点滴注射		●
		ソルデム3A注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回 2時間で		
注射	9	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回 60分で		
注射	10	点滴側管注		●
		生理食塩液 PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 （フラッシュ用）		
注射	11	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用		
内服				
		カペシタピン	2000mg/m ² 分2 食後	day(1)～(14)服用