

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●
注射 2	点滴側管注 プロイメント注 150mg 生食注（生理食塩液）100mL (PG) 点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30 分で	150mg 100mL	●
注射 3	点滴側管注 アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL デキサート注 3.3mg/1mL 点滴注射：1日1回 15 分で	1袋 9.9mg	●
注射 4	点滴側管注 トラスツズマブB S注 (6mg/kg) 生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 2回目以降30分可。	6mg/kg 250mL	●
注射 5	点滴側管注 マンニットールS注 300mL/袋 点滴注射：1日1回 30 分で	300mL	●
注射 6	点滴側管注 シスプラチニン注 (60mg/m²) 生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60 分で	60mg/m² 250mL	●
注射 7	点滴注射 ソルデム3A注 500mL 点滴注射：1日1回 2 時間で	500mL	●
注射 8	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 60 分で	500mL	●
注射 9	点滴側管注 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射 10	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒	●
内服	S-1	80mg/m² 分2 食後	day(1)~(14)服用