

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
注射	1	点滴注射		●	●	●	●	●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒 1筒					
		点滴注射：1日1回 (不要の場合は削除)						
注射	2	点滴注射		●				
		デキサート注 3. 3mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	6.6mg 1袋					
		点滴注射：1日1回 30分で						
注射	3	点滴注射		●				
		【要時】コスマゲン注 (10μg/kg又は0.5mg/B) 注射用水 20mL (1VあたりDW1.1mLで溶解) 生理食塩液PL 50mL	10μg/kg 1.1mL 50mL					
		点滴注射：1日1回 30分で						
注射	4	点滴注射		●				
		生理食塩液PL 50mL	50mL					
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用						
注射	5	静脈内注射		●				
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒					
注射	6	点滴注射		●	●	●	●	●
		デキサート注 3. 3mg/1mL 生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	6.6mg 100mL					
		点滴注射：1日1回 30分で						
注射	7	点滴注射		●	●	●	●	●
		【要時】コスマゲン注 (10μg/kg又は0.5mg/B) 注射用水 20mL (1VあたりDW1.1mLで溶解) 生理食塩液PL 50mL	10μg/kg 1.1mL 50mL					
		点滴注射：1日1回 30分で						
注射	8	点滴注射		●	●	●	●	●
		生理食塩液PL 50mL	50mL					
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用						
注射	9	静脈内注射		●	●	●	●	●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用	1筒					