

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒						
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミンロック）	1筒						
	ワンショット：1日1回							
	不要の場合は削除可							
注射 2	点滴注射		●	●	●	●	●	●
	デキサート注 3. 3mg/1m l	5A						
	生食注（生理食塩液）100m l（PG）	100m L						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 3	点滴注射		●	●				
	カiproリス注	20mg/m ²						
	（20mg/m ² 、最大44mg/B）							
	注射用蒸留水 100m l（PG）	1瓶						
	（カiproリス溶解用）							
	5%ブドウ糖注 100m l	100m L						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 4	点滴注射		●	●				
	生理食塩液PL 50m l	1瓶						
	点滴注射：1日1回							
	フラッシュ用							
注射 5	静脈内注射		●	●				
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒						
	ワンショット：1日1回							
	フラッシュ用							
	（不要の場合は削除）							
注射 6	点滴注射				●	●	●	●
	カiproリス注	56mg/m ²						
	56mg/m ² 、最大123mg/B							
	注射用蒸留水 100m l（PG）	1瓶						
	（カiproリス溶解用）							
	5%ブドウ糖注 100m l	100m L						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 7	点滴注射				●	●	●	●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶						
	点滴注射：1日1回							
	フラッシュ用							
注射 8	静脈内注射				●	●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒						
	ワンショット：1日1回							
	フラッシュ用							
	（不要の場合は削除）							
内服								
	レナデックス	20mg/日						
		分1-2 食後						
							day(22)(23)服用	