

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒	
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2	点滴注射		●
		プロイメント注 150mg	150mg	
		生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL	
		点滴注射：1日1回 30分で		
注射	3	点滴注射		●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg	
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回 15分で		
注射	4	点滴注射		●
		ハーセプチン注 (6mg/kg)	6mg/kg	
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL	
		点滴注射：1日1回 2回目以降30分可。		
注射	5	点滴注射		●
		エルプラット注 (130mg/m ²)	130mg/m ²	
		5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
		点滴注射：1日1回 120分で		
注射	6	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	7	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)		
内服				
		カペシタビン	2000mg/m ² 分2 食後	day(1)～(14)服用