

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(15)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミンロック） ワンショット：1日1回	1筒 1筒	●	●
注射	2	点滴注射 デキサート注 3.3mg / 1m l ボララミン注 5mg / 1m l 生食注（生理食塩液）100m l（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6A 1A 100m L	●	●
注射	3	点滴注射 生食注（生理食塩液）100m l（PG） 点滴注射：1日1回 30分以上かけて	1瓶	●	●
注射	4	点滴注射 ダラザレックス注 （16mg/kg） 生理食塩液注【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 最初1時間は100mL/hで開始、1時間毎に 50mL/hずつ上げ、200mL/hまで。 インラインフィルターを使用。	16mg /kg 500m L	●	●
注射	5	点滴注射 生理食塩液PL 50m l 点滴注射：1日1回	1瓶	●	●
注射	6	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●	●
内服		レナリドミド	25mg/日 分1 食後		day(1)～(21)服用
内服		レナデックス	20mg/日 分1 食後		day(2)(8)(9)(16)(22)(23)服用