

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射 1	静脈内注射 生食注シリンジ 20m l ロック付 ペリナナチン100単位/mLシリンジ 10mL(6.3mg) フラッシュ用 (不要の場合は削除可) ワンショット：1日1回	1筒 1筒	●	●	●
注射 2	点滴注射 ハイドロコトニン注 100mg/2m l ボラミン注 5mg/1m l 生食注(生理食塩液) 100m l (PG) 点滴注射：1日1回 30分で	100mg 1A 100mL	●		
注射 3	点滴注射 リツキマブBS注 (375mg/m ²) 生理食塩液注【生食】 500m l (1mg/mLになるように調整) 生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) (リツキマブの希釈に使用) 点滴注射：1日1回 初回50ml/hrで開始。30分毎に50ml/hrずつ上げ 400m l/hrまで。2回目以降100ml/hrで開始。 30分毎に100ml/hずつ上げ400ml/hまで	375mg/m ² 500mL 1袋	●		
注射 4	点滴注射 生理食塩液 P L 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●		
注射 5	点滴注射 生理食塩液注【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 8-12時間	500mL	●		
注射 6	点滴注射 生理食塩液注【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 8-12時間	500mL	●		
注射 7	点滴注射 ボラミン注 5mg/1m l デキサート注 3.3mg/1m l アロキシン注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用 30分で	1A 6.6mg 1袋		●	
注射 8	点滴注射 ボライビー注 (1.8mg/kg) 注射用水 20mL (ボライビー溶解用) 5%ブドウ糖注 50m l インラインフィルター使用 初回90分で 点滴注射：1日1回	1.8mg/kg 1A 50mL		●	
注射 9	点滴注射 生食注(生理食塩液) 100m l (PG) 点滴注射：1日1回 経過観察用 30分で	100mL		●	
注射 10	点滴注射 トリアキシン注 (90mg/m ²) 生理食塩液 P L 50m l 点滴注射：1日1回 10分で	90mg/m ² 50mL		●	
注射 11	点滴注射 生理食塩液 P L 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶		●	
注射 12	点滴注射 生理食塩液注【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 8-12時間	500mL		●	
注射 13	点滴注射 生理食塩液注【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 8-12時間	500mL		●	
注射 14	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1m l 生食注(生理食塩液) 100m l (PG) 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 100mL			●
注射 15	点滴注射 トリアキシン注 (90mg/m ²) 生理食塩液 P L 50m l 点滴注射：1日1回 10分で	90mg/m ² 50mL			●
注射 16	点滴注射 生理食塩液 P L 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶			●
注射 17	点滴注射 生理食塩液注【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 8-12時間	500mL		●	
注射 18	点滴注射 生理食塩液注【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 8-12時間	500mL		●	