

レジメン名称：R21-201 Ram/CPT-11 biweekly 休薬期間：14日

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	デキサート注 3.3 m g / 1 m l	6.6 m g	
	ポララミン注 5 m g / 1 m l	1 A	
	アロキシ注バッグ 0.75 m g / 50 m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	3 点滴注射		●
	サイラムザ注 (8mg/kg)	8m g /kg	
	生理食塩液注 250 m l (ソフトバッグ) (全量250mLに調製)	250m L	
	点滴注射：1日1回 (インラインフィルターを使用) 初回60分、忍容性良ければ2回目以降30分に短縮可。		
注射	4 点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50 m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	5 点滴注射		●
	カンプト注 (150mg/m ²)	150m g /m ²	
	生理食塩液注 250 m l (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回 90 分で		
注射	6 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		