

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	へパ リンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(へ ミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回		
	リザーバーフラッシュ用		
	(不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射（リザーバーより）		●
	デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	6.6 m g	
	アロキシ注バッグ 0.7 5 m g / 5 0 m L	1袋	
	点滴注射：1日1回		
	30 分で		
注射	3 点滴注射（リザーバーより）		●
	生理食塩液 P L 5 0 m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回		
	オニバイド投与前後フラッシュ用		
注射	4 点滴注射(リザーバーより)		●
	オニバイド注	70 m g / m ²	
	(70mg/m ²)		
	(UGT1A1変異：50m g / m ²)		
	5 %ブドウ糖注 5 0 0 m l	500m L	
	点滴注射：1日1回		
	インラインフィルター不可		
	★遮光で払い出し★		
	90 分で		
注射	5 点滴注射（リザーバーより）		●
	レボホリナート注	200 m g / m ²	
	(200mg/m ²)		
	生理食塩液注 2 5 0 m l (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回		
	120分で		
注射	6 点滴注射(リザーバーより)		●
	5 - F U 注	2400 m g / m ²	
	(2400mg/m ²)		
	生食注（生理食塩液） 1 0 0 m l (P G)	1瓶	
	(全量140m l に調製)		
	点滴注射：1日1回		
	type_T（青色タイプで持ち帰り）		
	46時間で		