

| 分類 No. | 薬剤/手技 | 投与量 | day(1) |
|--------|--|-----------------------|--------|
| 注射 1 | 静脈内注射（リザーバーより） | | ● |
| | 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 | 1筒 | |
| | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック) | 1筒 | |
| | ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) | | |
| 注射 2 | 点滴注射（リザーバーより） | | ● |
| | プロイメンド注 150mg | 150mg | |
| | 生食注（生理食塩液）100m l（PG） | 100mL | |
| | 点滴注射：1日1回 30分で | | |
| 注射 3 | 点滴注射（リザーバーより） | | ● |
| | デキサート注 3.3mg / 1m l | 9.9mg | |
| | アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL | 1袋 | |
| | 点滴注射：1日1回 15分で | | |
| 注射 4 | 点滴注射(リザーバーより) | | ● |
| | アバスチン注 (5mg/kg) | 5mg/kg | |
| | 生食注（生理食塩液）100m l（PG） | 100mL | |
| | 点滴注射：1日1回 30分で | | |
| 注射 5 | 点滴注射(リザーバーより) | | ● |
| | カンプト注 (165mg/m ²) | 165mg/m ² | |
| | 生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ） | 250mL | |
| | 点滴注射：1日1回 60分で | | |
| 注射 6 | 点滴注射（リザーバーより） | | ● |
| | レボホリナート注 (200mg/m ²) | 200mg/m ² | |
| | 生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ） | 250mL | |
| | 点滴注射：1日1回 エルプラットと同時に投与 120分で | | |
| 注射 7 | 点滴注射(リザーバーより) | | ● |
| | エルプラット注 (85mg/m ²) | 85mg/m ² | |
| | 5%ブドウ糖注 250m l | 250mL | |
| | 点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 120分で | | |
| 注射 8 | 点滴注射（リザーバーより） | | ● |
| | 生理食塩液 P L 50m l | 1瓶 | |
| | 点滴注射：1日1回 フラッシュ用。 | | |
| 注射 9 | 静脈内注射 | | ● |
| | 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 | 1筒 | |
| | ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 | | |
| 注射 10 | 点滴注射(リザーバーより) | | ● |
| | 5-FU注 (3200mg/m ²) | 3200mg/m ² | |
| | 生食注（生理食塩液）100m l（PG） (全量140m lに調製) | 1瓶 | |
| | 点滴注射：1日1回 type T（青色タイプで持ち帰り） 46時間で | | |