

レジメン名称：R15-101 Ramucirumab biweekly 休薬期間：14日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘミロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2	点滴注射		●
		デキサート注 3.3 m g / 1 m l	6.6 m g	
		ポララミン注 5 m g / 1 m l	1 A	
		生食注（生理食塩液）100 m l （P G）	100 m L	
		点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	3	点滴注射		●
		サイラムザ注 （8mg/kg）	8 m g / kg	
		生理食塩液注 250 m l （ソフトバッグ）	250 m L	
		点滴注射：1日1回 （全量250mLに調製） （インラインフィルターを使用） 初回60分で投与。忍容性が良好であれば、 2回目以降30分で投与。		
注射	4	点滴注射		●
		生理食塩液 P L 50 m l	1瓶	
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	5	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）		