

| 分類 | No. 薬剤/手技                           | 投与量                          | day(1)        |
|----|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 注射 | 1 静脈内注射（リザーバーより）                    |                              | ●             |
|    | 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付               | 1筒                           |               |
|    | パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（パリンロック）  | 1筒                           |               |
|    | ワンショット：1日1回<br>（不要の場合は削除）<br>フラッシュ用 |                              |               |
| 注射 | 2 点滴注射                              |                              | ●             |
|    | プロイメンド注 150mg                       | 150mg                        |               |
|    | 生食注（生理食塩液）100mL（PG）                 | 100mL                        |               |
|    | 点滴注射：1日1回<br>30分で                   |                              |               |
| 注射 | 3 点滴注射                              |                              | ●             |
|    | デキサート注 3.3mg/1mL                    | 6.6mg                        |               |
|    | アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL                | 1袋                           |               |
|    | 点滴注射：1日1回<br>15分で                   |                              |               |
| 注射 | 4 点滴注射                              |                              | ●             |
|    | アバスチン注<br>(7.5mg/kg)                | 7.5mg/kg                     |               |
|    | 生食注（生理食塩液）100mL（PG）                 | 100mL                        |               |
|    | 点滴注射：1日1回<br>30分で                   |                              |               |
| 注射 | 5 点滴注射                              |                              | ●             |
|    | カンプト注<br>(150mg/m <sup>2</sup> )    | 150mg/m <sup>2</sup>         |               |
|    | 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）                | 250mL                        |               |
|    | 点滴注射：1日1回<br>90分で                   |                              |               |
| 注射 | 6 点滴注射                              |                              | ●             |
|    | 生理食塩液PL 50mL                        | 1瓶                           |               |
|    | 点滴注射：1日1回<br>フラッシュ用                 |                              |               |
| 注射 | 7 静脈内注射                             |                              | ●             |
|    | 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付               | 1筒                           |               |
|    | ワンショット：1日1回<br>（不要の場合は削除）<br>フラッシュ用 |                              |               |
| 内服 |                                     |                              |               |
|    | S-1                                 | 80mg/m <sup>2</sup><br>分2 食後 | day(1)～(14)服用 |