

レジメン名称：P16-201 PTX（d1,8,15）/BV（d1,15） monthly

休薬期間：28日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミロック）	1筒			
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）				
注射	2	点滴注射		●	●	●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
		ガスター注 20mg	1A			
		ポララミン注 5mg/1mL	1A			
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL			
		点滴注射：1日1回 30分で				
注射	3	点滴注射		●	●	●
		パクリタキセル注 （90mg/m ² ）	90mg/m ²			
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL			
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で				
注射	4	点滴注射		●		●
		アバスチン注 （10mg/kg）	10mg/kg			
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL			
		点滴注射：1日1回 30分で				
注射	5	点滴注射		●	●	●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射	6	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用				