

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射		●
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒	
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	ソルデム3A注 500mL	500mL	
	点滴注射：1日1回 90分で		
注射 3	点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500mL	500mL	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 4	点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500mL	500mL	
	点滴注射：1日1回 60分かけて		
注射 5	点滴側管注		●
	プロイメンド注 150mg	150mg	
	生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL	
	点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管投与 30分で		
注射 6	点滴側管注		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 15分で		
注射 7	点滴側管注		●
	マンニトールS注 300mL/袋	300mL	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 8	点滴側管注		●
	シスプラチン注 (70mg/m ²)	70mg/m ²	
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL	
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で		
注射 9	点滴側管注		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 (フラッシュ用)		
注射 10	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		