

| 分類 No. | 薬剤/手技 | 投与量 | day(1) |
|--------|---|-------------------------|--------|
| 注射 1 | 静脈内注射（リザーバーより） | | ● |
| | 生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付 | 1筒 | |
| | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック) | 1筒 | |
| | ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) | | |
| 注射 2 | 点滴注射 | | ● |
| | デキサート注 3.3 mg / 1 mL | 6.6 mg | |
| | 生食注（生理食塩液）100 mL（PG） | 100 mL | |
| | 点滴注射：1日1回 30分で | | |
| 注射 3 | 点滴注射 | | ● |
| | 生理食塩液 PL 50 mL | 50 mL | |
| | 点滴注射：1日1回 アブラキサン投与前後フラッシュ用 | | |
| 注射 4 | 点滴注射 | | ● |
| | アブラキサン注 (260mg/m ²) | 260 mg / m ² | |
| | 生食注（生理食塩液）100 mL（PG） (1バイアルあたり20mLで溶解) | 100 mL | |
| | 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可。 30分で | | |
| 注射 5 | 静脈内注射 | | ● |
| | 生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付 | 1筒 | |
| | ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除) | | |