

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	持続点滴		●
	ソルデム3A注 500m l	500m L	
	★ 20m l メイロン84注	1A	
	持続点滴：1日1回 メイン 360分で		
注射 3	点滴注射		●
	ポラミン注 5mg / 1m l	1A	
	ハイドロコートン注 100mg / 2m l	100mg	
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 4	点滴注射		●
	リツキシマブBS注 (375mg/m <sup>2</sup> )	375mg / m <sup>2</sup>	
	生理食塩液注 【生食】 500m l (1mg/mLになるように調製)	500m L	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) (リツキシマブの希釈に使用)	1袋	
	点滴注射：1日1回 初回50mL/hで開始。30分毎に50mL/hずつ上げ 400mL/hまで。2回目以降100mL/hで開始。30 分毎に100mL/hずつ上げ400mL/hまで。 3-4h。2回目以降2-3h。		
注射 5	点滴注射		●
	水溶性プレドニン注 (60mg/m <sup>2</sup> ・Max100mg/B)	60mg / m <sup>2</sup>	
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m l	1袋	
	点滴注射：1日1回 15分で		
注射 6	点滴注射		●
	アドリアシン注 (50mg/m <sup>2</sup> )	50mg / m <sup>2</sup>	
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100m L	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 7	点滴注射		●
	オンコピン注 (1.4mg/m <sup>2</sup> 、最大2mg/B)	1.4mg / m <sup>2</sup>	
	生理食塩液PL 50m l	50m L	
	点滴注射：1日1回 全開。		
注射 8	点滴注射		●
	エンドキサン注 (750mg/m <sup>2</sup> )	750mg / m <sup>2</sup>	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回 90分で		
注射 9	点滴注射		●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 10	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		
内服			
	プレドニゾン	60mg / m <sup>2</sup> 分1食後	day(2)~(5)服用