

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用（キトルダ）		
注射	3 点滴注射		●
	キトルダ注 (200mg/body)	200mg	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分で		
注射	4 点滴注射		●
	ボラミン注 5mg/1mL	1A	
	ガスター注 20mg	1A	
	デキサート注 3.3mg/1mL	16.5mg	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	5 点滴注射		●
	パクリタキセル注 (200mg/m ²)	200mg/m ²	
	生理食塩液注【生食】 500mL	500mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 180分で		
注射	6 点滴注射		●
	カルボプラチン (AUC=6)	0mg/A	
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射	7 点滴注射		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	8 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		