

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射 1	静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射 2	点滴注射		●		
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 3	点滴注射		●		
	カルセド注	35mg/m ²			
	生理食塩液PL 50mL (35mg/m ²)	50mL			
	点滴注射：1日1回 全開で				
注射 4	点滴注射		●		
	生理食塩液PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射 5	静脈内注射		●		
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用				
注射 6	点滴注射			●	●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 7	点滴注射			●	●
	カルセド注	35mg/m ²			
	生理食塩液PL 50mL (35mg/m ²)	50mL			
	点滴注射：1日1回 全開で				
注射 8	点滴注射			●	●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射 9	静脈内注射			●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用				