

| 分類 No. | 薬剤/手技 | 投与量 | day(1) | day(15) |
|--------|---|-----------------------------------|--------|---------|
| 注射 1 | 静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ﾊﾞﾘﾝNaｱｸﾞ用100単位/mLシリンジ 10mL(ﾊﾞﾘﾝNaｸﾞ) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) | 1筒 1筒 | ● | ● |
| 注射 2 | 点滴注射 ソルデム3A注 500m l 点滴注射：1日1回 2 時間で | 500m L | ● | |
| 注射 3 | 点滴注射 グリーン3G注 500m L 点滴注射：1日1回 2 時間で | 500m L | ● | |
| 注射 4 | 点滴注射 グリーン3G注 500m L 点滴注射：1日1回 90 分で | 500m L | ● | |
| 注射 5 | 点滴側管注 プロイメンド注 150m g 生食注 (生理食塩液) 100m l (P G) 点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管投与 30 分で | 150m g 100m L | ● | |
| 注射 6 | 点滴側管注 デキサート注 3. 3m g / 1m l ガスター注 20m g ポララミン注 5m g / 1m l アロキシンバッグ 0.75m g / 50m L 点滴注射：1日1回 15 分で | 16.5m g 1A 1A 1袋 | ● | |
| 注射 7 | 点滴側管注 バクリタキセル注 (135mg/m ²) 生理食塩液注【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 180分で | 135m g / m ² 500m L | ● | |
| 注射 8 | 点滴側管注 マンニトールS注 300m L / 袋 点滴注射：1日1回 30 分で | 300m L | ● | |
| 注射 9 | 点滴側管注 シスプラチン注 (60mg/m ²) 生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) 点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60 分で | 60m g / m ² 250m L | ● | |
| 注射 10 | 点滴側管注 生理食塩液P L 50m l 点滴注射：1日1回 (フラッシュ用) | 1瓶 | ● | |
| 注射 11 | 静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 | 1筒 | ● | |
| 注射 12 | 点滴注射 デキサート注 3. 3m g / 1m l ガスター注 20m g ポララミン注 5m g / 1m l 生食注 (生理食塩液) 100m l (P G) 点滴注射：1日1回 30 分で | 16.5m g 1A 1A 100m L | | ● |
| 注射 13 | 点滴側管注 バクリタキセル注 (135mg/m ²) 生理食塩液注【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 180分で | 135m g / m ² 500m L | | ● |
| 注射 14 | 点滴側管注 エトポシド注 (150mg/m ²) 5%ブドウ糖注 500m l 点滴注射：1日1回 90 分で | 150m g / m ² 500m L | | ● |
| 注射 15 | 点滴側管注 生理食塩液P L 50m l 点滴注射：1日1回 (フラッシュ用) | 1瓶 | | ● |
| 注射 16 | 静脈内注射 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用 | 1筒 | | ● |