

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 2 0 m l 【要時】 ロック付	1筒			
		へ`リンNaロック用100単位/mLシリンジ                       10mL(へ`ミロック)	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		(不要の場合は削除)				
注射	2	点滴注射		●		
		デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	6.6m g			
		ポララミン注 5 m g / 1 m l	1 A			
		ガスター注 2 0 m g	1 A			
		アロキシ注バッグ 0.7 5 m g / 5 0 mL	1袋			
		点滴注射：1日1回				
		30 分で				
注射	3	点滴注射		●		
		パクリタキセル注	60m g / m ²			
		(60mg/m²)				
		生理食塩液注 2 5 0 m l (ソフトバッグ)	250m L			
		点滴注射：1日1回				
		インラインフィルターを使用				
		60 分で				
注射	4	点滴注射		●		
		カルボプラチン	0m g / A			
		(AUC=6)				
		5 % ブドウ糖注 2 5 0 m l	250m L			
		点滴注射：1日1回				
		60 分で				
注射	5	点滴注射		●		
		生理食塩液 P L 5 0 m l	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		フラッシュ用				
		10 分で				
注射	6	静脈内注射		●		
		生食注シリンジ 2 0 m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		(不要の場合は削除)				
		フラッシュ用				
注射	7	点滴注射			●	●
		生食注 (生理食塩液) 1 0 0 m l (P G)	100m L			
		デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	6.6m g			
		ガスター注 2 0 m g	1 A			
		ポララミン注 5 m g / 1 m l	1 A			
		点滴注射：1日1回				
		30 分で				
注射	8	点滴注射			●	●
		パクリタキセル注	60m g / m ²			
		(60mg/m²)				
		生理食塩液注 2 5 0 m l (ソフトバッグ)	250m L			
		点滴注射：1日1回				
		インラインフィルターを使用				
		60 分で				
注射	9	点滴注射			●	●
		生理食塩液 P L 5 0 m l	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		フラッシュ用				
		10 分で				
注射	10	静脈内注射			●	●
		生食注シリンジ 2 0 m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		(不要の場合は削除)				
		フラッシュ用				