

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射 1	静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒			
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパロック)	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射 2	点滴注射		●		
	デキサート注 3.3mg/1ml	9.9mg			
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 3	点滴注射		●		
	アドリアシン注 (40mg/m ²)	40mg/m ²			
	生理食塩液 P L 50m l	50m L			
	点滴注射：1日1回 全開で				
注射 4	点滴注射		●		
	シスプラチン注 (25mg/m ²)	25mg/m ²			
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L			
	点滴注射：1日1回 60分で				
注射 5	点滴注射		●		
	エトポシド注 (80mg/m ²)	80mg/m ²			
	5%ブドウ糖注 250m l	250m L			
	点滴注射：1日1回 60分で				
注射 6	点滴注射		●		
	生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
	フラッシュ用 点滴注射：1日1回 10分で				
注射 7	静脈内注射		●		
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
	フラッシュ用				
注射 8	点滴注射			●	●
	デキサート注 3.3mg/1ml	6.6mg			
	生食注(生理食塩液) 100m l (P G)	100m L			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 9	点滴注射			●	●
	エトポシド注 (80mg/m ²)	80mg/m ²			
	5%ブドウ糖注 250m l	250m L			
	点滴注射：1日1回 60分で				
注射 10	点滴注射			●	●
	生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
	フラッシュ用 点滴注射：1日1回 10分で				
注射 11	静脈内注射			●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
	フラッシュ用				