

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●	●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒			
	ワンショット：1日1回				
	不要の場合は削除可				
注射 2	点滴注射		●	●	●
	デキサート注 3.3mg/1mL	10A			
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
	点滴注射：1日1回				
	30分で				
注射 3	点滴注射		●		
	カイプロリス注	20mg/m ²			
	(20mg/m ² 、最大44mg/B)				
	注射用蒸留水 100mL (PG)	1瓶			
	(カイプロリス溶解用)				
	5%ブドウ糖注 100mL	100mL			
	点滴注射：1日1回				
	30分で				
注射 4	点滴注射		●		
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回				
	フラッシュ用				
注射 5	静脈内注射		●		
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回				
	フラッシュ用				
	(不要の場合は削除)				
注射 6	点滴注射			●	●
	カイプロリス注	70mg/m ²			
	70mg/m ² 、最大154mg/B				
	★全量250mLに調製★				
	注射用蒸留水 100mL (PG)	1瓶			
	(カイプロリス溶解用)				
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL			
	点滴注射：1日1回				
	30分で				
注射 7	点滴注射			●	●
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回				
	フラッシュ用				
注射 8	静脈内注射			●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回				
	フラッシュ用				
	(不要の場合は削除)				
内服					
	レナデックス	40mg/日			day(22)服用
		分1-2 食後			