

レジメン名称：P16-201 PTX/CBDCA triweekly（婦人科癌） 休薬期間：21日

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	デキサート注 3.3 m g / 1 m l	16.5m g	
	ポララミン注 5 m g / 1 m l	1 A	
	ガスター注 20 m g	1 A	
	アロキシ注バッグ 0.75 m g / 50 mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	3 点滴注射		●
	パクリタキセル注 (180mg/m ²)	180m g / m ²	
	生理食塩液注 【生食】 500 m l	500m L	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 180分で		
注射	4 点滴注射		●
	カルボプラチン (AUC=4-6)	0m g / A	
	5%ブドウ糖注 250 m l	250m L	
	点滴注射：1日1回 60 分で		
注射	5 点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50 m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10 分で		
注射	6 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		