

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
	ペリンNaの用100単位/mLシリンジ 10mL(ベシナ)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴側管注		●
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保用		
注射	3 点滴注射		●
	オブジーボ注 (360mg/Body)	360mg	
	生理食塩液 PL 50mL	50mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用 単独投与、ソルデムと併用しない 30分で		
注射	4 点滴側管注		●
	生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 投与間隔30分確保用 30分で		
注射	5 点滴側管注		●
	ヤーボイ注 (1mg/kg)	1mg/kg	
	生理食塩液 PL 50mL (全量30mLに調製)	30mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 オブジーボ投与後30分あけて 30分で		
注射	6 点滴注射		●
	ソルデム3A注 500mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 ヤーボイ終了後投与開始 90分で		
注射	7 点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 90分で		
注射	8 点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射	9 点滴側管注		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg	
	アロキン注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	10 点滴側管注		●
	アリムタ注射用 (500mg/m <sup>2</sup> )	500mg/m <sup>2</sup>	
	生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL	
	点滴注射：1日1回 ヤーボイ投与後30分あけて 10分で		
注射	11 点滴側管注		●
	マンニトールS注 300mL/袋	300mL	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	12 点滴側管注		●
	シスプラチン注 (75mg/m <sup>2</sup> )	75mg/m <sup>2</sup>	
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL	
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で		
注射	13 点滴側管注		●
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	14 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		