

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ヘリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘリンロック） ワンショット：1日1回	1筒 1筒	●
注射	2	点滴注射 ソルデム3A注 500mL ★ 20mL メイロン84注 点滴注射：1日1回 210分で	500mL 1A	●
注射	3	点滴側管注 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 （プライミング用）	1瓶	●
注射	4	点滴側管注 プロイメンド注 150mg 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	150mg 100mL	●
注射	5	点滴側管注 ★ 40mg ソル・メドロール注 アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 15分で	40mg 1袋	●
注射	6	点滴側管注 プレオ注 （9mg/m ² 、最大15mg/B） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 1時間で	9mg/m ² 100mL	●
注射	7	点滴側管注 アドリアシン注 （25mg/m ² ） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	25mg/m ² 100mL	●
注射	8	点滴側管注 エクザール注 （6mg/m ² 、最大10mg/B） 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 適宜 全開	6mg/m ² 50mL	●
注射	9	点滴側管注 ダカルバジン注【遮光】 （375mg/m ² ） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 1時間で	375mg/m ² 250mL	●
注射	10	点滴側管注 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射	11	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）	1筒	●