

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	へパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(へパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	6.6 m g	
	ポララミン注 5 m g / 1 m l	1 A	
	生食注（生理食塩液）100 m l （P G）	100m L	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	3 点滴注射		●
	サイラムザ注 (10mg/kg)	10m g /kg	
	生理食塩液注 250 m l （ソフトバッグ）	250m L	
	点滴注射：1日1回 (全量250mLに調製) (インラインフィルターを使用) 初回60分で投与。忍容性が良好であれば、 2回目以降30分で投与。		
注射	4 点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50 m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用。		
注射	5 点滴注射		●
	ドセタキセル注 (60mg/m ²)	60m g /m ²	
	生理食塩液注 250 m l （ソフトバッグ）	250m L	
	点滴注射：1日1回 60 分で		
注射	6 点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50 m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	7 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		