レジメン名称：C19-101 CBDCA(30) daily＋RT　(NSCLC)　　休薬期間：43日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(8)	day(9)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●	●	●	●
		生食注シリンジ　２０ｍｌ【要時】ロック付	1筒							
		ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ10mL(ﾍﾟﾐﾛｯｸ)	1筒							
		ワンショット：１日１回								
		（不要の場合は削除）								
注射	2	点滴注射		●	●	●	●	●	●	●
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	1瓶							
		点滴注射：１日１回								
		ライン確保およびフラッシュ用								
注射	3	点滴注射		●	●	●	●	●	●	●
		カルボプラチン	30ｍｇ/㎡							
		（30mg/㎡）								
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	100ｍＬ							
		点滴注射：１日１回								
		30分で								
注射	4	静脈内注射		●	●	●	●	●	●	●
		生食注シリンジ　２０ｍｌ【要時】ロック付	1筒							
		ワンショット：１日１回								
		（不要の場合は削除）								
		フラッシュ用								

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(10)	day(11)	day(12)	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)
注射	5	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●	●	●	●
		生食注シリンジ　２０ｍｌ【要時】ロック付	1筒							
		ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ10mL(ﾍﾟﾐﾛｯｸ)	1筒							
		ワンショット：１日１回								
		（不要の場合は削除）								
注射	6	点滴注射		●	●	●	●	●	●	●
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	1瓶							
		点滴注射：１日１回								
		ライン確保およびフラッシュ用								
注射	7	点滴注射		●	●	●	●	●	●	●
		カルボプラチン	30ｍｇ/㎡							
		（30mg/㎡）								
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	100ｍＬ							
		点滴注射：１日１回								
		30分で								
注射	8	静脈内注射		●	●	●	●	●	●	●
		生食注シリンジ　２０ｍｌ【要時】ロック付	1筒							
		ワンショット：１日１回								
		（不要の場合は削除）								
		フラッシュ用								

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(19)	day(22)	day(23)	day(24)	day(25)	day(26)
注射	9	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●	●	●
		生食注シリンジ　２０ｍｌ【要時】ロック付	1筒						
		ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ10mL(ﾍﾟﾐﾛｯｸ)	1筒						
		ワンショット：１日１回							
		（不要の場合は削除）							
注射	10	点滴注射		●	●	●	●	●	●
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	1瓶						
		点滴注射：１日１回							
		ライン確保およびフラッシュ用							
注射	11	点滴注射		●	●	●	●	●	●
		カルボプラチン	30ｍｇ/㎡						
		（30mg/㎡）							
		生食注（生理食塩液）１００ｍｌ（ＰＧ）	100ｍＬ						
		点滴注射：１日１回							
		30分で							
注射	12	静脈内注射		●	●	●	●	●	●
		生食注シリンジ　２０ｍｌ【要時】ロック付	1筒						
		ワンショット：１日１回							
		（不要の場合は削除）							
		フラッシュ用							