

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射	2 点滴注射		●	●	●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射	3 点滴注射		●	●	●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 アブラキサン投与前後フラッシュ用				
注射	4 点滴注射		●	●	●
	アブラキサン注 (125mg/m ²)	125mg/m ²			
	生食注（生理食塩液）100mL（PG） (1バialあたり20mLで溶解)	100mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分で				
注射	5 点滴注射		●	●	●
	ジェムザール注 (1000mg/m ²)	1000mg/m ²			
	5%ブドウ糖注 100mL	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射	6 点滴注射		●	●	●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射	7 静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用				