

レジメン名称：E20-201 Ram/Erlotinib(d1-14) biweekly

休薬期間：14日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘミロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2	点滴注射		●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg	
		パララミン注 5mg/1mL	1A	
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
		点滴注射：1日1回 30分で		
注射	3	点滴注射		●
		サイラムザ注 （10mg/kg）	10mg/kg	
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） （全量250mLに調製）	250mL	
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 初回60分、忍容性良ければ2回目以降30分に短縮可。		
注射	4	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	5	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用		
内服				
		エルロチニブ	150mg/日 分1 空腹時	連日服用