

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒						
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパロック)	1筒						
	ワンショット：1日1回							
注射 2	点滴注射		●					
	デキサート注 3.3mg / 1ml	6A						
	ポララミン注 5mg / 1ml	1A						
	生食注（生理食塩液）1000ml（PG）	100mL						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 3	点滴注射		●					
	生食注（生理食塩液）1000ml（PG）	1瓶						
	点滴注射：1日1回							
	30分以上かけて							
注射 4	点滴注射		●					
	ダラザレックス注 (16mg/kg)	16mg/kg						
	生理食塩液注【生食】 500ml	500mL						
	点滴注射：1日1回							
	最初1時間は100mL/hで開始、1時間毎に 50mL/hずつ上げ、200mL/hまで。 インラインフィルターを使用。							
注射 5	点滴注射		●					
	生理食塩液PL 50ml	1瓶						
	点滴注射：1日1回							
	ダラザレックスフラッシュ用							
注射 6	点滴注射		●					
	カイプロリス注 (56mg/m ²)	56mg/m ²						
	注射用蒸留水 1000ml（PG） (カイプロリス溶解用)	1瓶						
	5%ブドウ糖注 1000ml	100mL						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 7	点滴注射		●					
	生理食塩液PL 50ml	1瓶						
	点滴注射：1日1回							
	カイプロリスフラッシュ用							
注射 8	点滴注射			●	●	●	●	●
	デキサート注 3.3mg / 1ml	6A						
	生食注（生理食塩液）1000ml（PG）	100mL						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 9	点滴注射			●	●	●	●	●
	カイプロリス注 (56mg/m ²)	56mg/m ²						
	注射用蒸留水 1000ml（PG） (カイプロリス溶解用)	1瓶						
	5%ブドウ糖注 1000ml	100mL						
	点滴注射：1日1回							
	30分で							
注射 10	点滴注射			●	●	●	●	●
	生理食塩液PL 50ml	1瓶						
	点滴注射：1日1回							
	カイプロリスフラッシュ用							
内服								
	レナデックス	40mg/日						day(22)服用
		分1 食後						