リ大只「	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(2
射	1 静脈内注射(リザーバーより)		•	•	•	•	•	•	•
	生食注シリンジ 20m1【要時】ロック付	1筒							
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL(ペミロック)	1筒							
ń÷	ワンショット:1日1回		•		•		•		
別	2 点滴注射 デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	6 A			•		•		
	ポララミン注 5 mg/1ml	1 A							
	生食注(生理食塩液)100ml(PG)	100m L							
	点滴注射:1日1回								
	30 分で								
射	3 点滴注射		•		•		•		
	生食注(生理食塩液)100ml (PG)	1瓶							
	点滴注射:1日1回								
	30 分以上かけて								
射	4 点滴注射		•		•		•		
	ダラザレックス注	16m g/kg							
	(16mg/kg)	500m L							
	生理食塩液注【生食】 500ml 点滴注射:1日1回	300III L							
	ぶ周圧列・101回 最初1時間は100mL/hで開始、1時間毎に								
	50mL/hずつ上げ、200mL/hまで。								
	インラインフィルターを使用。								
射	5 点滴注射		•		•		•		
	生理食塩液PL 50ml	1瓶							
	点滴注射:1日1回								
	ダラザレックスフラッシュ用								
射	6 点滴注射		•						
	カイプロリス注	56m g/m²							
	(56mg/m²)	d NE							
	注射用蒸留水 100ml (PG)	1瓶							
	(カイプロリス溶解用)	100 1							
	5 % ブドウ糖注 100 m l 点滴注射: 1日1回	100m L							
	※周圧剤・1 日 1 回 30分で								
射	7 点滴注射		•						
	生理食塩液PL 50ml	1瓶							
	点滴注射:1日1回								
	カイプロリスフラッシュ用								
射	8 点滴注射			•		•		•	
	デキサート注 3.3mg/1ml	6 A							
	生食注(生理食塩液)100ml(PG)	100m L							
	点滴注射:1日1回								
射	30 分で 9 点滴注射								
31	カイプロリス注	56m g/m²							
	(56mg/m²)	30111 87111							
	注射用蒸留水 100ml (PG)	1瓶							
	(カイプロリス溶解用)								
	5%ブドウ糖注 100ml	100m L							
	点滴注射:1日1回								
	** 0								
_	30分で								
射	30分で 10 点滴注射			•	•	•	•	•	
射	10 点滴注射 生理食塩液 P L 5 0 m l	1瓶		•	•	•	•	•	
射	10 点滴注射 生理食塩液 P L 5 0 m l 点滴注射: 1日1回	1瓶		•	•	•	•	•	
	10 点滴注射 生理食塩液 P L 5 0 m l 点滴注射: 1 日 1 回 カイプロリスフラッシュ用	1瓶		•	•	•	•	•	
	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射			•	•	•	•	•	•
	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml	12 A		•	•	•	•	•	•
	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ポララミン注 5mg/1ml	12 A 1 A		•	•	•	•	•	•
	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml	12 A	_	•	•	•	•	•	•
	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ポララミン注 5mg/1ml 生食注(生理食塩液)100ml(PG)	12 A 1 A	_	•	•	•	•	•	•
射	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ボララミン注 5mg/1ml 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回	12 A 1 A		•	•	•	•	•	•
:射	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ボララミン注 5mg/1ml 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30 分で	12 A 1 A		•	•	•	•	_	•
:射	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ポララミン注 5mg/1ml 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30 分で 12 点滴注射	12 A 1 A 100 m L		•	•	•	•	•	•
射	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ボララミン注 5mg/1ml 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30 分で 12 点滴注射 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30 分以上かけて	12 A 1 A 100 m L		•	•	•	•	•	•
射射	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ボララミン注 5mg/1ml 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30 分で 12 点滴注射 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30 分以上かけて 13 点滴注射	12 A 1 A 100 m L 1瓶		•	•		•	_	•
射	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ボララミン注 5mg/1ml 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30 分で 12 点滴注射 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30 分以上かけて 13 点滴注射 ダラザレックス注	12 A 1 A 100 m L		•	•		•		•
射	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ボララミン注 5mg/1ml 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分で 12 点滴注射 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分以上かけて 13 点滴注射 ダラザレックス注 (16mg/kg)	12 A 1 A 100 m L 1瓶 16 m g /kg		•	•		•		•
射	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ボララミン注 5mg/1ml 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分で 12 点滴注射 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分以上かけて 13 点滴注射 ダラザレックス注 (16mg/kg) 生理食塩液注【生食】500ml	12 A 1 A 100 m L 1瓶		•	•				•
射	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ボララミン注 5mg/1ml 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分で 12 点滴注射 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分以上かけて 13 点滴注射 ダラザレックス注 (16mg/kg) 生理食塩液注【生食】500ml 点滴注射:1日1回	12 A 1 A 100 m L 1瓶 16 m g /kg		•	•				•
射	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ボララミン注 5mg/1ml 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分で 12 点滴注射 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分以上かけて 13 点滴注射 ダラザレックス注 (16mg/kg) 生理食塩液注【生食】500ml 点滴注射:1日1回 最初1時間は100mL/hで開始、1時間毎に	12 A 1 A 100 m L 1瓶 16 m g /kg		•	•				•
射射	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ポララミン注 5mg/1ml 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分で 12 点滴注射 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分以上かけて 13 点滴注射 ダラザレックス注 (16mg/kg) 生理食塩液注【生食】500ml 点滴注射:1日1回 最初1時間は100mL/hで開始、1時間毎に 50mL/hずつ上げ、200mL/hまで。	12 A 1 A 100 m L 1瓶 16 m g /kg		•	•				•
射射射射射	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ボララミン注 5mg/1ml 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分で 12 点滴注射 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分以上かけて 13 点滴注射 ダラザレックス注(16mg/kg) 生理食塩液注【生食】500ml 点滴注射:1日1回 最初1時間は100mL/hで開始、1時間毎に 50mL/hずつ上げ、200mL/hまで。 インラインフィルターを使用。	12 A 1 A 100 m L 1瓶 16 m g /kg		•					•
射射射射射	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ボララミン注 5mg/1ml 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分で 12 点滴注射 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分以上かけて 13 点滴注射 ダラザレックス注(16mg/kg) 生理食塩液注【生食】500ml 点滴注射:1日1回最初1時間は100mL/hで開始、1時間毎に50mL/hずつ上げ、200mL/hまで。インラインフィルターを使用。	12 A 1 A 100 m L 1瓶 16 m g /kg 500 m L							•
射射射	10 点滴注射 生理食塩液PL 50ml 点滴注射:1日1回 カイプロリスフラッシュ用 11 点滴注射 デキサート注 3.3mg/1ml ボララミン注 5mg/1ml 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分で 12 点滴注射 生食注(生理食塩液)100ml(PG) 点滴注射:1日1回 30分以上かけて 13 点滴注射 ダラザレックス注(16mg/kg) 生理食塩液注【生食】500ml 点滴注射:1日1回 最初1時間は100mL/hで開始、1時間毎に 50mL/hずつ上げ、200mL/hまで。 インラインフィルターを使用。	12 A 1 A 100 m L 1瓶 16 m g /kg							•