

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(15)	day(16)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒				
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒				
	ワンショット：1日1回					
	不要の場合は削除可					
注射 2	点滴注射		●		●	
	デキサート注 3.3mg/1ml	10A				
	生食注（生理食塩液）100ml（PG）	100mL				
	点滴注射：1日1回					
	30分で					
注射 3	点滴注射		●			
	カイプロリス注	27mg/m ²				
	27mg/m ² 、最大59.4mg/B					
	注射用蒸留水 100ml（PG）	1瓶				
	（カイプロリス溶解用）					
	5%ブドウ糖注 50ml	50mL				
	点滴注射：1日1回					
	10分で					
注射 4	点滴注射		●			
	生理食塩液 PL 50ml	1瓶				
	点滴注射：1日1回					
	フラッシュ用					
注射 5	静脈内注射		●			
	生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付	1筒				
	ワンショット：1日1回					
	（不要の場合は削除）					
	フラッシュ用					
注射 6	点滴注射			●		●
	生食注（生理食塩液）100ml（PG）	1瓶				
	点滴注射：1日1回					
	ルート確保およびフラッシュ用					
注射 7	点滴注射			●	●	●
	カイプロリス注	27mg/m ²				
	27mg/m ² 、最大59.4mg/B					
	注射用蒸留水 100ml（PG）	1瓶				
	（カイプロリス溶解用）					
	5%ブドウ糖注 50ml	50mL				
	点滴注射：1日1回					
	10分で					
注射 8	静脈内注射			●	●	●
	生食注シリンジ 20ml 【要時】 ロック付	1筒				
	ワンショット：1日1回					
	（不要の場合は削除）					
	フラッシュ用					
注射 9	点滴注射				●	
	生理食塩液 PL 50ml	1瓶				
	点滴注射：1日1回					
	フラッシュ用					
内服						
	レナリドミド	25mg/日 分1 食後				day(1)～(21)服用
内服						
	レナデックス	40mg/日 分1-2 食後				day(8)(22)服用